

BioSynergie & Clémenceau

Boulevard Clémenceau
83300 DRAGUIGNAN

Enlèvement: 04.94.50.96.55

Portable de garde : 06.20.28.91.50

Feuille de prélèvement CHOC ANAPHYLACTOÏDE

Médecin prescripteur

Nom :

Adresse :

Téléphone:

Patient

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Date de prélèvement :

T0 Heure :

T1 Heure :

T0

15 à 30 minutes après

Tube EDTA

T1

1 à 2 heures après

Tube EDTA

Tube Sec/Gel

Indiquer ici l'allergène suspecté:

- Latex
 - Oxyde d'éthylène
 - Formol
 - Propofol
 - Thiopental
 - Hypnomidate
 - Plasma BM
 - Curare (préciser)
 - Ammonium IV (préciser)
 - Pénicilline (préciser)
- Autres (à préciser en clair):

Identifier les tubes après le prélèvement

Nom, Prénom, heure de prélèvement

Conserver les tubes au réfrigérateur (+4°C)

PREVENIR IMMEDIATEMENT LE LABORATOIRE

Renseignements cliniques

Circonstances d'apparition :

Délai d'apparition des symptômes :

Symptômes et gravité du choc (grade I à IV) :

Signes cutanés
isolés

Réaction systémique
modérée

Réaction mettant
la vie en danger

Arrêt cardiaque
ou respiratoire

Autres réactions cliniques observées:

Antécédents d'allergie: